

УДК 595.762.11/.12 (477.63)

© 1999 г. В. В. БРИГАДИРЕНКО

**ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ ТРИБЫ PTEROSTICHINI
(COLEOPTERA, CARABIDAE) ПОЙМЕННЫХ И АРЕННЫХ БИОТОПОВ САМАРСКОГО БОРА**

Жужелицы трибы Pterostichini – всесветно распространенная, богатая родами и видами (около 2500 видов) группа (Крыжановский, 1983); на территории Украины представлена не менее чем 60 видами (Kryzhanovskij et al., 1995).

Изучению лесных видов Pterostichini посвящено большое количество работ. Однако внимание уделялось в первую очередь отдельным наиболее массовым видам. Почти во всех фаунистических сводках семейства по тому или иному региону фигурируют виды трибы, отмечаются те или иные их экологические особенности. В ряде работ рассматриваются различные вопросы биотического распределения видов трибы в лесной зоне (Кудряшова, 1970; Шарова, 1971; Грюталь, 1985). Изучению жужелиц лесных сообществ степной и юга лесостепной зон посвящено небольшое число публикаций (Кришталь, 1956; Кириченко, 1997, 1998). В них имеются и сведения о фауне видов трибы Pterostichini в отдельных типах лесов. Однако детальное изучение их распределения по различным типам краткопоемных и аренных лесов не проводилось.

Данная работа является продолжением изучения биотического распределения в различных типах леса жужелиц Присамарья Днепровского (ранее были рассмотрены закономерности распространения видов трибы Carabini (Бригадиренко, 1998).

Отлов жужелиц проводился в пойменных и аренных лесах реки Самары на базе Присамарского биосферного мониторингового стационара (окр. с. Андреевка Новомосковского района Днепропетровской области) с помощью ловушек Барбера (стеклянные емкости 0,25 л, с 20% раствором поваренной соли). В данной работе рассматриваются усредненные данные за период от начала июня до второй декады июля 1997 г. Одновременно функционировало более 200 ловушек на 36 пробных площадях. Система пробных площадей приводится по типологии естественных лесов степной зоны А. Л. Бельгарда (1971), там же можно найти их описание. Система жизненных форм принята по И. Х. Шаровой (1974).

Список обнаруженных видов представлен в таблице.

Таблица

**Виды жужелиц трибы Pterostichini лесных экосистем Самарского бора,
их основные экологические характеристики.**

Вид	Ареал	Жизненная форма
<i>Poecilus (s. str.) cupreus dinniki</i> Lutshnik, 1912	ЕСб	Зсзпп
<i>P. (s. str.) versicolor</i> (Sturm, 1824)	ЕСб	Зсзпп
<i>Stomis (s. str.) pumicatus</i> (Panzer, 1796)	ЕСр	Зссп
<i>Pterostichus (Phonias) ovoideus</i> (Sturm, 1824)	ЕСр	Зссп
<i>P. (Argutor) vernalis</i> (Panzer, 1796)	ЕСб	Зссп
<i>P. (Melanius) minor</i> (Gyllenhal, 1827)	ЕСб	Зссп
<i>P. (M.) gracilis gracilis</i> (Dejean, 1828)	ЕСб	Зсзпп
<i>P. (M.) anthracinus</i> (Illiger, 1798)	ЕСб	Зсзпп
<i>P. (M.) nigrita</i> (Paykull, 1790)	ТП	Зсзпп
<i>P. (Bothriopterus) oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	ТП	Зсзпп
<i>P. (Morphnosoma) melanarius melanarius</i> (Illiger, 1798)	ЕСб	Зсзпп
<i>P. (Platysma) niger niger</i> (Schaller, 1783)	ТП	Зсзпп

Примечание: Есб – европейско-сибирские, Еср – европейско-средиземноморские, ТП – транспалеарктические виды; Зссп – зоофаги стратобионты-скважники подстилочные, Зсзпп – зоофаги стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные.

Распределение видов трибы по всем обследованным пробным площадям краткопоемных и аренных лесов представлено на рисунке.




Рис. 1. Соотношение численностей жужелиц трибы *Pterostichini* в различных лесорастительных условиях Самарского бора.

AB1 — **сосняк с пишайчиком;** AB1-2 — **сосняк с зелеными мхами;** AB2-3 — **сосновый разнотравьем;** C3 — **сосново-дубняк с сырьим с букацией;** B3 — **серопозняк с сырьим крупнотравьем;** C3 — **сосново-дубняк с молинией и снытью;** C4 — **березовый ольп с сырьим крупнотравьем;** D'ac2-2 — **липо-ясеневая дубрава со звездчаткой;** D'ac2-3 — **липо-ясеневая дубрава с широкотравьем;** D'as1-2 — **липо-ясеневая дубрава с ежой;** D'c2-2 — **липовая дубрава со звездчаткой;** D'c2-3 — **липовая дубрава с широкотравьем;** D'n1-2 — **бересто-ясеневая дубрава с ежой;** D'n2 — **бересто-ясеневая дубрава с будрой;** D'n2-3 — **бересто-ясеневая дубрава с крапивой;** D'n4 — **ольп с сырьим крупнотравьем.**

В гигрофильных условиях серолозняков с сырьим крупнотравьем численность видов трибы находится на высоком уровне, доминируют *Pt. anthracinus* и *Pt. ovoideus*. В березовом ольсе с сырьим крупнотравьем численность изучаемых видов очень низка; причины почти полного отсутствия видов трибы в этом типе леса требуют дальнейшего изучения. В ольсах с сырьим крупнотравьем доминируют *Pt. minor* и *Pt. nigrita*. В большинстве других типов обследованных лесных экосистем доминантами являются *Pt. oblongopunctatus* и *Pt. ovoideus*.

Таким образом, виды трибы распространены в большинстве типов лесных экосистем, в некоторых типах леса составляют до 90% от общей численности жужелиц в герпетобии. В гигрофильных типах леса доминируют *Pt. anthracinus*, *Pt. minor* и *Pt. nigrita*. В более мезофильных условиях максимума численности достигают *Pt. oblongopunctatus* и *Pt. ovoideus*. Очень низка численность видов трибы в наиболее сухих типах сосновых лесов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бельгард А. Л. Степное лесоведение. – М.: Лесн. промышленность, 1971. – 270 с.
- Бригадиренко В. В. Закономерности распределения редких жужелиц трибы Carabini (Coleoptera, Carabidae) Самарского бора // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника. – Канів: Фітосоціоцентр, 1998. – С. 157–159.
- Грюнталль С. Ю. Ландшафтно-зональные особенности распределения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесах центральных районов европейской части СССР // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1985. – Т. 90, № 5. – С. 15–25.
- Кириченко М. Б. До вивчення фауни турунів (Coleoptera, Carabidae) північно-східного лісостепу України // Ізв. Харк. ентомол. об-ва. – 1997. – Т. 5, № 2. – С. 75–79.
- Кириченко М. Б. К изучению фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) пойменных биотопов левобережной лесостепи Украины // Вестн. зоол. – 1998. – № 4. – С. 38–44.
- Кришталь О. П. Ентомофауна ґрунту та підстилки в долині середньої течії р. Дніпра. – К: Вид-во КДУ, 1956. – 423 с.
- Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Adephaga: сем. Rhysopidae, сем. Trachypachyidae; сем. Carabidae (вводн. часть, обзор фауны СССР). – Л.: Наука, 1983. – 341 с.
- Кудряшова И. В. Изменение почвенной фауны в процессе развития ясенево-кленово-снытевых дубрав и в связи с рубкой // Взаимоотношения биогеоценозов в лиственных молодняках. – М.: Наука, 1970. – С. 163–177.
- Шарова И. Х. Особенности биотического распределения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в зоне смешанных лесов Подмосковья // Фауна и экология животных. – М.: МГПИ. – 1971. – С. 61–86.
- Шарова И. Х. Жизненные формы имаго жужелиц (Coleoptera, Carabidae) // Зоол. журн. – 1974. – Т. 53, № 5. – С. 692–709.
- A Checklist of the Ground-Beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). / Kryzhanovskij O. L., Belousov I. A., Kabak I. I. et al. – Sofia-Moscow: Pensoft Publishers, 1995. – 271 p.

Днепропетровский государственный университет

V. V. BRIGADIRENKO

DISTRIBUTION REGULARITIES OF THE CARABUS OF THE TRIBE PTEROSTICHINI (COLEOPTERA, CARABIDAE) FROM THE FLOOD-LAND AND ARENACEOUS ECOSYSTEMS OF THE SAMARSKIY BOR

Dnepropetrovsk State University

S U M M A R Y

A study of ecology and spatial distribution of 12 species which belong to the genera *Poecilus*, *Stomis* and *Pterostichus* was conducted in 27 forest ecosystems of the first and second terraces of the Samara river (Ukraine, Dnepropetrovsk Region, Novomoskovskiy district). The article analyses distribution of individual species according to the forest types.