

## ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ, ВІДЛУЧЕНИХ У МІСЯЧНОМУ ВІЦІ

**О. І. Чалий**

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій  
тваринництва та птахівництва; [chalyialex64@gmail.com](mailto:chalyialex64@gmail.com)

*Державний біотехнологічний університет*

**Постановка питання.** У практиці свинарства до останнього часу раціональне використання маточного поголів'я полягало у підвищенні плодючості, збереженні приплоду та в одержанні від кожної основної свиноматки двох опоросів на рік.

Відлучення поросят від свиноматок у 2-місячному віці не має правильного наукового обґрунтування через недостатнє вивчення питання про кількісні та якісні потреби підсисних поросят у поживних речовинах. За даними багатьох дослідників, потреба молодняку у поживних речовинах свиноматка здатна задовольняти лише у перші 15-20 діб. Пізніше материнського молока не вистачає, тому ріст і розвиток поросят залежить від кількості згодованих кормів.

**Вирішення проблеми.** З метою вивчення ефективності відлучення поросят у місячному віці провели порівняльний аналіз отриманих даних. Середня жива вага поросят при народженні становить 1,3 кг. Свиноматок з поросятами утримували при звичайних господарських умовах. Починаючи з 5-го дня життя, поросят привчали до поїдання зернової суміші та збираного молока. Зернову суміш згодовували досхочу, а з 8-денного віку поросят привчали до поїдання свіжого збираного молока з розрахунку 50 г на голову за добу, а у віці з 15- до 30-денного віку по 450 г. За підсисний період до місячного віку в середньому на одне поросля витрачено по 4 кг кормової суміші в 1 кг якої було 1,03 к.од, 185 гр перетравного протеїну. У місячному віці вага дослідних і контрольних поросят у середньому була приблизно однакова 6,2 кг та 6,0 кг. В цілому середня жива вага поросят дослідної групи у 2-місячному віці була на 1,2 кг більше ваги поросят контрольної групи. При досягненні віку 4 місяців поросята дослідної групи мали вагу 39,3 кг, в той час тварини контрольної групи мали вагу в межах 36,7 кг в розрахунку на одну голову.

**Висновок.** Відлучення поросят у місячному віці, за умов збалансованої годівлі та утримання, позитивно впливає на їх подальший розвиток. Головна перевага раннього відлучення поросят полягає у більш інтенсивному використанні свиноматок, що дозволяє одержати від маток 2,3 опоросу на рік, що вигідно при круглорічних опоросах.

### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Довідник оператора по відтворенню і вирощуванню свиней / В. П. Рибалко та ін. К.: Урожай. 1985. 136 с.
2. Иванов В. О., Волощук М. В. Біологія свиней: навч. посіб. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2009. 304 с.
3. Майструк С. Технологія вирощування поросят до чотиримісячного віку. *Тваринництво України*. 2005. № 9. С. 9-11.
4. Nekotorye voprosy kormleniya i soderzhaniya porosyat-otemyshej / Erik Van Hojten i dr. *Efektivne tvarinnictvo*. 2008. № 1. S. 12-14.
5. Опара В. О., Проваторов Г. В., Проваторова В. О. Вплив живої маси при відлученні, а також збалансованості раціонів на ріст та відтворну здатність ремонтних свинок. *Вісник Сумського ДАУ. Сер. «Тв-во»*. Суми, 2000. Вип. 4. С. 89-93.